

الريتونويدات الموضعية في علاج المليساء المعدية في المرضى الوافدين إلى مستشفى الخالص: دراسة مراقبة العلاج الوهمي مستشفى الخالص العام

د. محمد احمد مهدي¹ و د. تحسين عبد الزهرة مخيلف²

الملخص

خلفية الدراسة: المليساء المعدية هي التهاب فيروسي جلدي شائع ينظر في الأطفال والبالغين. وهو ناتج عن فيروس المليساء المعدية وهو فيروس الحامض النووي، والمتعلقة بمجموعة الجدري من الفايروسات.

اهداف الدراسة: لتحديد مدى فعالية الريتونويدات الموضعية في علاج المليساء المعدية في المرضى العراقيين في مدينة الخالص.

المرضى والطرائق: أربعون من المرضى المصابين بالمليساء المعدية قسمت عشوائيا إلى مجموعتين. أعطيت المجموعة الأولى كريم الريتونويدات الموضعية بتركيز 0.05% ليتم تطبيقها في وقت النوم على الآفات. أما المجموعة الثانية فقد أعطيت علاج وهمي (aquarosa cream) ليتم تطبيقها في وقت النوم على الآفات. كانت فترات العلاج ستة أسابيع لكلا الفريقين.

النتائج: أظهرت المجموعة الأولى في نهاية الستة أسابيع نسبة شفاء ما يقارب 65% (13 مريضا) في حين أن المجموعة الثانية أظهرت أن مريض واحد فقط من المجموعة قد اكتسب الشفاء الكامل 5%.

الاستنتاجات: أن ريتونويد الموضعي هو علاج فعال للمليساء المعدية بعد ستة أسابيع من العلاج مقارنة مع الدواء الوهمي مع نسبة نجاح 65% و 5% على التوالي.

الكلمات المفتاحية: المليساء المعدية, الريتونويدات.

البريد الإلكتروني: sajad.7508@yahoo.com

تاريخ استلام البحث: 20 آذار 2017

تاريخ قبول البحث: 14 أيار 2017

^{1,2} مستشفى الخالص العام- الخالص – ديالى- العراق.