

نتائج المرضى الذين يعانون من داء الليشمانيات الحشوي في محافظة ديالى

أ.د.داود سلمان حميد العزاوي¹ , عمر داود سلمان العزاوي² , م.د.اسيل جاسم محمد³ و فرح وليد سليمان⁴

الملخص

خلفية الدراسة: داء الليشمانيات الحشوي هو ثاني أكبر طفيلي قاتل في العالم بعد الملاريا.
أهداف الدراسة: نتائج المرضى المصابين بداء الليشمانيات الحشوي في عينات المستشفى اعتمادا على اختبار بقعة لتشخيص لمرض.

المرضى والطرائق: أجريت هذه الدراسة في مستشفى البتول التعليمي في بعقوبة - ديالى خلال فترة من كانون الثاني 2015 الى كانون الاول 2015. جمعت خلالها 35 حالة يشتبه في اصابتها بالحمى السوداء. كما جمعت معلومات عن تاريخ الاعراض المرضية فيما يتعلق ب العنوان، الجنس، العمر، جود الحيوانات و نوع فصيلة الدم. الفحص السريري والتحليل المختبرية تم القيام بها تمثلت ب صورة الدم الكاملة، سونار البطن، واختبار البقعة الذي ثبت تشخيص مرضى الحمى السوداء.

النتائج: اتضح نتائج الدراسة ان نسبة المصابين بالمرض أكثر بين الذكور (60%) من الإناث (40%) وكان أكثر شيوعا في فصلي الربيع والشتاء، وأقل في فصلي الصيف والخريف وعلى النحو التالي (48.5%، 31%، 14% و 0.05%). وجدت علاقة المرض وفصيلة الدم أكثر شيوعا مع نوع A, B, O وأقل شيوعا في فصيلة الدم AB, O. 57%، 22%، 14%، 5% بالتتابع. كان 29% شكل ضخامة الأعضاء 57% (ضخامة الطحال 14%، تضخم الكبد 17%، ضخامة الكبد والطحال كان 26%) وعدم ضخامة الأعضاء 43%. وقد تبين أن جميع المرضى يعانون من فقر الدم، وهناك 43% من فقر الدم الخفيف (10mg% وأقل) و 57% من فقر الدم الحاد الشديد (7mg% وأقل). كما وجدت أن نسبة مدة حمى 17% <أسبوع، 31% (2-1) أسابيع، 52% > 2 أسابيع.

الاستنتاجات: ان المرض أكثر شيوعا بين المناطق الريفية 71%، من المدن.

الكلمات المفتاحية: الحمى السوداء، فقر الدم، ضخامة الأعضاء، منطقة ريفية.

البريد الإلكتروني: Dawood_alazawi@yahoo.com

تاريخ استلام البحث: 4 كانون الاول 2016

تاريخ قبول البحث: 12 اذار 2017

^{3,1} كلية طب - جامعة ديالى - ديالى - العراق.

² كلية اليرموك الجامعة - بغداد - العراق.

⁴ وزارة الصحة - بغداد العراق.