

نتائج التدبیس الجانبي عن طريق الجلد لكسور مافوق اللقمة المزاحة من عظم العضد لدى الاطفال

د. ياسين ثامر حسين¹ و د. عبد الرحمن سعيد احمد²

الملخص

خلفية الدراسة: كسر مافوق اللقمة لدى الاطفال هو الكسر الاكثر حصولا في العقد الاول من العمر. الارجاع المغلق والتدبیس عن طريق الجلد تم تبنیه ليكون الطريقة العلاجية المختارة ونتائج هذه الطريقة تعتمد بصورة رئيسية على اتقان ارجاع الكسر و استقرارية التثبيت. وهناك عدة اشكال لتدبیس هذا الكسر تم استعمالها .
اهداف الدراسة: لتقييم كفاءة و امان الارجاع المغلق والتدبیس الجانبي المستخدم في علاج كسور مافوق اللقمة المزاحة من عظم العضد لدى الاطفال.

المرضى والطرائق : 38 مصاب بكسر من النوع الانبساطي من الصنف الثالث حسب تصنيف كارت لاند لكسر مافوق اللقمة المزاح من عظم العضد لدى الاطفال بعمر (5,1-13) سنة تم شمولهم بالبحث في الفترة من نيسان 2014 ولغاية حزيران 2016 . عدد الذكور كان (26) بنسبة (4,68%) بينما كان عدد الاناث (12) بنسبة (6,31%) وكان متوسط العمر (8,5) سنة . كانت اصابة الطرف العلوي الايسر في (25) مريضا بنسبة (8,65%) بينما الطرف الايمن اصيب في (13) مريض (2,34%) . جميع الحالات خضعت لعملية التدبیس الجانبي عن طريق الجلد وخلال الـ(24) ساعة الاولى بعد الاصابة وفي كل حالة استعمل اثنان من دبایس (ك) لتثبيت الكسر من الناحية الوحشية للمرفق .

النتائج: لقد تم الحصول على ارجاع مستقر ومقنع للكسور في جميع الحالات ماعدا واحدة حيث حصل فيها فشل في ارجاع الكسر في فترة مابعد العملية . جميع الحالات استعادت مستوى كامل لحركة الانبساط والانقباض للمرفق بعد حوالي (3-4) اشهر . درجة بومان كانت بمقدار (5,2±76) درجة و (5,0±74) درجة في الطرف المصاب و الطرف السليم بالتتابع . لم تحصل مضاعفات وعائیه و عصبیه مابعد العملية في جميع الحالات.

الاستنتاجات: تدبیس كسر مافوق اللقمة في العضد لدى الاطفال باستعمال(ك-واير) وذلك بتثبيت الكسر من الناحية الوحشية للمرفق اعطى تثبيت مستقر و امان.

الكلمات المفتاحية: كسر مافوق اللقمة لعظم العضد, الارجاع المغلق, التدبیس الوحشي.

البريد الالكتروني: dr-saeed8688@hotmail.com

تاريخ استلام البحث: 25 كانون الاول 2016

تاريخ قبول البحث: 4 حزيران 2017

^{1,2} قسم جراحة الكسور - مستشفى بعقوبة العام التعليمي - ديالى - العراق.